

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą šį informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba per 3 dienas nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys

1. Kas yra Indovasin gelis ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Indovasin gelio
3. Kaip vartoti Indovasin gelio
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Indovasin gelio laikymo sąlygos
6. Kita informacija

Indovasin 30/20 mg/g gelis

Indometacinas ir trokserutinas

- *Veiklioji medžiaga.* Viename grame gelio yra 30 mg indometacino ir 20 mg trokserutino.
- *Pagalbinės medžiagos.* Karbomerai, makrogolis 400, propilenglikolis, natrio benzoatas, etanolis (96 %).

Registravimo liudijimo turėtojas

Actavis Nordic A/S
Hammervej 7, 2970 Hørsholm,
Danija

Gamintojas

SIA Briz,
Rasas 5, LV-1057 Riga,
Latvija

1. KAS YRA INDOVASIN GELIS IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Indovasin gelis yra nesteroidinis preparatas nuo uždegimo. Be to, jis koreguoja medžiagų apykaitą. Preparatas slopina lokalų uždegimą, malšina skausmą bei mažina audinių pabrinkimą. Vaistas tinka, jei yra sąnarių ir raumenų ligos: tepalinio maišelio, sausgyslių ir jų makščių, tepalinės plėvės, raumenų uždegimas bei kitokios ligos. Prieš varikozę arba jos metu pasireiškiantis sindromas (jis sukelia skausmą ir audinių patinimą), traumos sukeltos kraujosruvos, būklė po ilgalaikio nejudrumo ir kitoks sutrikimas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT INDOVASIN GELIO

Indovasin gelio vartoti draudžiama, jei:

- padidėjęs jautrumas sudedamosioms preparato dalims, acetilsalicilo rūgščiai ar kitokiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; jei yra paūmėjusi skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, dėl neaiškių priežasčių sutrikęs kraujo krešėjimas;

- ligonis serga acetilsalicilo rūgšties (salicilatų) arba kitų nesteroidinių preparatų nuo uždegimo sukelta bronchine astma.

Be to, preparatas netinka nėščioms moterims ir žindyvėms.

Specialios atsargumo priemonės vartojant vaisto

Preparato galima vartoti tik ant odos. Indovazinu negalima tepti atvirų žaizdų, akių bei gleivinės.

Jaunesniems negu 14 metų pacientams vaisto galima vartoti tik gydytojo nurodymu. Jis netinka ligoniams, sergantiems bronchine astma. Medikamento ir kitokių nesteroidinių preparatų nuo uždegimo kartu vartoti nereikėtų.

Jei indovazino vartojama ilgau negu 10 dienų, būtina tikrinti kraujo sudėtį (leukocitų ir trombocitų kiekį).

Dėl galimos Indovasin gelio sąveikos su antibiotikais, antikoaguliantais, vaistais nuo diabeto bei kai kuriais kitokiais preparatais būtina stebėti paciento būklę bei reikiamų laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčius.

Nėštumas

Prieš vartojant bet kokią vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėščioms moterims Indovasin gelis netinka.

Žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokią vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindyvėms Indovasin gelio vartoti draudžiama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepasireiškia.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Pacientams, kurių sveikatos būklę nuolat stebi gydytojas arba kurie vartoja kitokių nesteroidinių preparatų nuo uždegimo, prieš tepant Indovasin gelio reikia pasitarti su gydytoju.

3. KAIP VARTOTI INDOVASIN GELIO

Indovasin gelio visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Preparato galima vartoti tik ant odos!

2 – 3 kartus per dieną 1 – 2 cm gelio juostelę reikia užtepti ant pažeistos vietos ir švelniai įtrinti.

Jeigu manote, kad Indovasin gelis veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Indovasin gelio dozę

Iš išorės vartojamo gelio perdozavimo nepastebėta. Jei didesniam odos plotui gydyti reikia ilgai tepti daugiau gelio, preparato reikia vartoti atsargiai.

Pamiršus pavartoti Indovasin gelio

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima. Vaisto reikia vartoti toliau taip, kaip įprasta.

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Indovasin gelio vartojimą

Gali vėl paūmėti liga.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Indovasin gelis, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinių poveikių.

Labai retai atsiranda virškinimo trakto negalavimų bei alerginė odos reakcija: išbėrimas, paraudimas, dilgėlinė, niežulys. Jei prasideda alerginė reakcija, preparato vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją.

Pastebėję šiame lapelyje neminėtą šalutinį poveikį, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. INDOVASIN GELIO LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Vidinę pakuotę laikyti sandarią.

Tinkamumo laikas – 2 metai.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2005 03 15

Spec. redaktorius – doc. A. Milašius
Tekstą redagavo V. Jurkienė